

靜脈注射泌尿系統攝影檢查(IVP)

經放射診斷科醫師檢視

※什麼是靜脈注射泌尿系統攝影檢查(IVP)？

靜脈注射腎盂攝影檢查乃是經由靜脈注射水溶性顯影劑，使腎盂輸尿管與膀胱顯影，藉以檢查尿路系統之方法。

※檢查危險性？

靜脈注射顯影劑可能發生輕度（打噴嚏、皮膚紅疹、搔癢、寒顫等），中度（全身蕁麻疹、持續嘔吐、喉頭水腫、呼吸困難等）及重度（明顯的支氣管收縮、休克、威脅生命的心律不整等）的過敏反應，依病人體質而有差異。有極少數病人（約十萬分之一的機會）可能發生致死的過敏反應。

※哪些病人不適合作靜脈注射腎盂攝影檢查呢？

1. 對顯影劑有過敏病史者，尤其是曾發生嚴重過敏者，如休克，呼吸困難，肺水腫。
2. 有過敏體質者，如患有氣喘，過敏性疾病，對特定藥物、物品、食物曾有過敏反應者、腎功能不良者。

※檢查過程？

檢查過程必須先照一張腎臟、輸尿管、膀胱的X光片，再由靜脈注射顯影劑，於注射後5分鐘、15分鐘、30分鐘分別照X光片，並依每位病人不同的病情需要加照不同體位或延長時間、解尿後之X光片。全程約30至40分鐘。

※檢查後有哪些注意事項呢？

1. 多喝水，有利顯影劑排出。
2. 身體有任何不適反應，請立即回醫院告知我們，以便處理。

※檢查前，需要作哪些準備工作？

依指示單說明先喝瀉藥，以便清除腸胃，避免遮住腎臟和輸尿管的結石，同時前一晚飯後須禁食固體食物(可喝水)。



林新醫院
臺中市南屯區惠中路三段36號
電話：04-2258-6688#1700



烏日林新醫院
臺中市烏日區榮和路168號
電話：04-2338-8766#1700