

使用阿托平(Atropine)眼藥水注意事項

經眼科醫師檢視

◆ 為什麼要點此眼藥水：

1. 為了要正確驗光：看東西的時候，眼睛內的肌肉會收縮或放鬆，幫助水晶體調整厚度以便調好焦點，才能將東西看的清楚，這種作用叫「調節力」，年齡越小的人，「調節力」越強，以致影響眼睛屈折度(近視、遠視、亂視度數)的檢查，所以檢查兒童的屈折度，尤其視力不好時，必須點藥水來放鬆眼睛內的肌肉，才能得到正確的度數，也才能決定是否需要戴眼鏡，才不致因為戴了度數不對的眼鏡或因為延遲矯正，而使情形越來越糟。
2. 為了控制或減緩近視的度數不再增加。

◆ 點眼藥水後會發生的變化：

1. 看東西的時候焦點不準，尤其看不清楚近處的東西，(特別是有遠視、亂視、或輕度近視的人)。
2. 瞳孔散大、看亮處覺得怕光、眩目。
3. 這些變化只是暫時性的，停止點眼藥後一至二星期即可恢復原狀，不必擔心。

◆ 眼藥水的使用方法

1. 1天點(1次、2次)(睡前點，早、晚各一次)，一次點一滴即可，不可間斷，直到檢查完為止。
2. 點藥時，眼球往上看，藥水滴在下眼瞼往下拉所形成的空間不要直接點在黑眼珠上。
3. 點過眼藥水後，最好保持仰臥姿勢。
4. 幼兒或體質比較特殊的#人、有時會發生發燒、紅臉之現象(停藥後均會自癒不必驚慌)，如果有此現象，請勿繼續點藥，並於次日前來複診。

◆ 眼藥水的保存方式

1. 請收存在冰箱裡面或放在非陽光直射的地方。
2. 此眼藥水是專供檢查及治療用，除本人以外，絕對禁止他人使用。
3. 近視患者長期點此藥時，建議配戴可隔絕紫外線之眼鏡。

