

胰島素(Insulin)用藥指導

經藥劑專家檢視

一. 胰島素(Insulin)種類

學名	商品名/含量	中文商品名	外觀
Regular Insulin	Actrapid 1000 IU/10ml/vial	愛速基因人體 胰島素	
Insulin aspart	NovoRapid FlexPen 300 IU/3ml/pen	諾和瑞諾易筆	
30% Insulin aspart 70% crystallised Insulin aspart	Novomix 30 Flexpen 300 IU/3ml/pen	諾和密斯 30諾 易筆注射劑	
Isophane Insulin	Insulatard HM 100 IU/10ml/vial	因速來達 胰島速注射劑	
25% insulin lispro +75% insulin lispro protamine suspension	Humalog Mix 25 300 IU/3ml/pen	優泌樂筆 -混合型25	
50% insulin lispro +50% insulin lispro protamine suspension	Humalog Mix 50 300 IU/3ml/pen	優泌樂筆 -混合型50	
Insulin glargine	Toujeo 450IU/1.5ml/pen	糖德仕注射劑	



林新醫院
臺中市南屯區惠中路三段36號
電話：04-2258-6688#1716



烏日林新醫院
臺中市烏日區榮和路168號
電話：04-2338-8766#1716

二. 作用

治療糖尿病

三. 用法

1. 遵醫囑劑量用藥，一般為皮下注射。遵醫囑抽藥，注射部位應每次相距約2.5公分，可選擇上臂兩側、大腿、臀部或腹部之區域。
2. 用前需於手上轉至均勻且不冰冷，再抽藥注射。
3. 如須混合常規型與中效或長效型使用，其抽藥方法，請先諮詢專業醫療人員。

四. 注意事項

1. 飲食及運動應規律，定量定時。延時飲食或過度運動會引起低血糖。
2. 如病患感不適，尤以嘔吐或發燒、腹瀉、無法進食時，因可能需調整用量，請與醫師聯絡。
3. 注意個人衛生與足部健康避免感染。每年至少至牙科診查兩次，至眼科診查一次。
4. 遵醫囑測量血糖、糖化血色素、微蛋白尿檢查，作為血糖控制情形之參考。如有高血糖(多尿、口渴、虛弱、噁心、頭昏)，則應就診。
5. 應配戴標識註明病患為糖尿病病人，以供急救時辨識。
6. 酒精飲料可能會引起低血糖，應謹慎小心。
7. 告知醫師所有使用之藥品，使用含酒精或糖份之成藥前，應先告知醫師或藥師。

五. 忘記用藥時該怎麼辦？

應先詢問醫師處理方法

六. 副作用

如有低血糖症狀(冒冷汗、顫抖、心悸、虛弱、頭痛、昏亂)，應立即進食含糖飲料或食物，如果汁、糖水、方糖(巧克力吸收較慢，不適合使用)，如未見改善則送急診。低血糖嚴重昏迷，請立即送急診。

七. 藥品該如何存放？

一般置冰箱冷藏，不可冷凍。開封後可置陰涼處。旅行則置隨身行李，避震、避光及熱。若胰島素出現外觀變化，請勿使用。

商品名(外觀)	開封後儲存及保存期限
愛速基因人體胰島素(本品澄清無色溶液)	室溫下(<30°C)可保存6星期
因速來達胰島速注射劑(本品白色懸浮液)	室溫下(<30°C)可保存6星期
諾和瑞諾易筆(本品澄清無色溶液)	室溫下(<30°C)可保存4星期
諾和密斯 30 諾易筆注射劑(本品白色懸浮液)	室溫下(<30°C)可保存4星期
優泌樂筆-混合型25(本品白色懸浮液)	室溫下(<30°C)可保存4星期
優泌樂筆-混合型50(本品白色懸浮液)	室溫下(<30°C)可保存4星期
糖德仕注射液(本品澄清無色溶液)	室溫下(<30°C)可保存4星期