

多汗症手術後需知

經神經外科醫師檢視

- 一. 手術後請依排定時間返院門診，如發現雙腋下傷口腫脹疼痛，有異常分泌物或呼吸困難不適、發燒、傷口大量出血、傷口裂開、胸口劇烈疼痛、胸痛加劇、皮下氣腫或血腫、手掌或手臂腫脹、麻木或變黑紫冰冷時，請請立即就醫。
- 二. 返家後身體沐浴清潔時，傷口請先暫時勿碰水，保持乾燥即可，不需自行換藥。
- 三. 按時返院門診，併於門診由醫師或護理師執行換藥。
- 四. 一週內兩手避免抬高超過肩膀，勿做手部拉提等大動作以免拉扯傷口。
- 五. 保持傷口清潔乾爽避免潮濕。
- 六. 衣服穿著勿太緊，以穿寬鬆透氣且吸汗的質料為佳。
- 七. 一個月內避免劇烈運動如：游泳、打網球、羽毛球、提重物等
- 八. 無任何飲食禁忌，可依自己平日飲食進食。
- 九. 可能出現代償性排汗現象，如胸腹、背或下肢的出汗量會增加。



林新醫院
臺中市南屯區惠中路三段36號
電話：04-2258-6688#6282



烏日林新醫院
臺中市烏日區榮和路168號
電話：04-2338-8766