

Dabigatran 用藥指導

經藥劑專家檢視

一. 院內藥物介紹(NOAC, Direct thrombin inhibitor)

學名	商品名/含量	中文商品名
Dabigatran	Pradaxa 110mg /cap	普栓達膠囊110毫克
	Pradaxa 75mg /cap	普栓達膠囊75毫克

二. 作用

預防血栓的形成。用來預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞，或用於靜脈血栓高危險群病患，以預防接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)發生。

三. 用法

1. 請依照醫師的指示，每日固定時間服用。
2. 未經醫師指示不可自行增減劑量或停藥。



林新醫院
 臺中市南屯區惠中路三段36號
 電話：04-2258-6688#1716



烏日林新醫院
 臺中市烏日區榮和路168號
 電話：04-2338-8766#1716

四. 使用注意事項

1. 膠囊應整粒吞服，不可弄破，咀嚼、或取出該藥物，這可能使藥物在體內的藥量大幅增加，造成出血風險。
2. 嚴重腎功能不全者不建議使用，請與您的醫師討論。
3. 請告知醫師或藥師，您目前正在服用的藥物(包括成藥、中草藥、保健食品等)。
4. 執行手術、拔牙治療、侵入性檢查時，需告知醫師您正在服用此藥。

五. 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時應立即服藥；若已接近或已到下次用藥時間，則只需服用下一次劑量，絕不可一次服用雙倍劑量。

六. 副作用

1. 以下症狀變嚴重或一直未改善，請回診時告知醫師：
 - 噁心、消化不良
2. 若發生以下副作用請盡速就醫：
 - 異常出血（例如：血便或黑便、血尿、咳血或褐色物質、經血量過多、牙齦出血、割傷後長時間才止血）
 - 食道炎、胃炎、胃潰瘍