

Rivaroxaban用藥指導

經藥劑專家檢視

一. 院內藥物介紹(NOAC, Direct factor Xa inhibitor)

學名	商品名/含量	中文商品名
Rivaroxaban	Xarelto 15 mg/tab	拜瑞妥膜衣錠

二. 作用

預防及治療深部靜脈血栓及肺栓塞，或用於成人非瓣膜性心房纖維顫動病患，且有以下至少一項危險因子者，預防發生中風與全身性栓塞。危險因子包含：1.曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作2.年齡 ≥ 75 歲3.高血壓4.糖尿病5.有症狀之心衰竭（NYHA Class \geq II）。

三. 用法

1. 請依照醫師的指示，每日固定時間服用。
2. 未經醫師指示不可自行增減劑量或停藥。



林新醫院
臺中市南屯區惠中路三段36號
電話：04-2258-6688#1716



烏日林新醫院
臺中市烏日區榮和路168號
電話：04-2338-8766#1716

四. 使用注意事項

1. 執行手術、拔牙治療、侵入性檢查時，需告知醫師您正在服用此藥。
2. 若正在服用其他藥物(尤其是消炎止痛藥、Aspirin、Warfarin等)，請告知醫師或藥師。

五. 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時應立即服藥；若已接近或已到下次用藥時間，則只需服用下一次劑量，絕不可一次服用雙倍劑量。

六. 副作用

1. 以下症狀變嚴重或一直未改善，請回診時告知醫師：
 - 虛弱、疲勞
 - 頭痛、眩暈
 - 噁心、腸胃不適
2. 若發生以下副作用請盡速就醫：
 - 異常出血（例如：血便或黑便、血尿、咳血或褐色物質、經血量過多、牙齦出血、割傷後長時間才止血）
 - 四肢疼痛、昏厥
 - 搔癢、皮疹、蕁麻疹等過敏症狀